


Modifications des praxies oro-faciales par voie bottom-up

Auteurs :

Patrick Fellus



Institutions :

Orthodontie, ancien consultant des hôpitaux de Paris, France

Résumé :

La compréhension et le traitement précoce des origines fonctionnelles des dysmorphoses peut permettre de diminuer l'incidence des traitements orthopédiques voir chirurgicaux et plus on interviendra précocement, meilleurs seront les résultats.

Comme l'écrivait le Pr Delaire, dans la préface de notre ouvrage «De la dysfonction à la dysmorphose en orthodontie pédiatrique» cela «permet de comprendre certains échecs des traitements orthopédiques se contentant de corriger une des anomalies des dysmorphoses dento-faciales, par exemple le rangement dentaire»

Mais même une fois le cadre anatomique physiologique restauré ou instauré, la réussite des rééducations des fonctions oro-faciales comprenant engrammation et automatisation seront difficiles pour le jeune enfant avant 8 ans par la voie classique top-down. Le recours à la voie bottom-up permettra d'obtenir ce résultat dès la denture temporaire.

Le maintien tardif des habitudes de succion aura une responsabilité considérable dans l'étiologie des infraclusies antérieures mais aussi des anomalies transversales et antéro-postérieures.

NE PAS TRAITER PRÉCOCEMENT RISQUE DE TRANSFORMER UNE ERREUR D'AIGUILLAGE DE LA CROISSANCE FACIALE EN MALADIE CHRONIQUE